

<b>PIQÛRES D'INSECTES ET SYMPTÔMES ASSOCIÉS</b>		<b>Numéro M-F2</b>
<b>ACTE MÉDICAL AUTORISÉ A 1.18</b>		
<b>Conditions locales</b>	Ordonnance médicale permanente <b>(X)</b> Selon le protocole <b>(P)</b>	
<b>BÉNADRYL® / diphenhydramine</b>	<b>CENTRES MULTISERVICES</b>	<b>CLSC</b>
	<b>X P</b>	<b>X P</b>

**PROTOCOLE :**

**Indication :**

- Chez les clients se présentant avec :
  - Une réaction allergique légère à modérée : urticaire peu marqué, prurit oculaire, prurit local et écoulement nasal.
  - Des piqûres d'insectes avec œdème et prurit local important au pourtour du site de la piqûre.

**Contre-indications :**

- Hypersensibilité connue à ce médicament.
- Grossesse
- Glaucome à angle fermé non contrôlé.
- Maladies hépatiques graves : hépatite ou cirrhose décompensée.
- Insuffisance rénale sévère.
- Troubles de rétention urinaire significatifs.

**Limite :**

- S'assurer qu'il n'y a pas de signes d'une réaction systémique plus importante, tels que : œdème, éruptions urticariennes et prurit généralisés, troubles respiratoires et/ou circulatoire. En ce cas, faire voir immédiatement par un médecin.

Appliquer, au besoin, l'ordonnance permanente «Choc anaphylactique de toute origine : Adrénaline S/C» A 1.18 M-F1.

**Précautions :**

- Aviser les clients/parents des effets secondaires possibles : sécheresse de la bouche, vision trouble, étourdissements, somnolence ou excitation paradoxale.
- Mettre en garde contre la consommation d'autres déprimeurs du SNC (ex. : Graval®, autres antihistaminiques, sirop antitussif, etc.).

**Directives :**

- Surveiller les signes de réaction systémique progressive.
- Bénédryl® 1 mg/kg/dose, répétable au besoin toutes les 6-8 heures.
  - Adultes et enfants > 12 ans : 50 mg
  - Clientèle adulte gériatrique : 25 mg
  - 6 à 12 ans : 25 mg
  - 2 à 5 ans : 6,25 mg
- Dans le cas de piqûres d'insecte :
  - Retirer le dard s'il est visible.
  - Recommander l'application de glace sur la partie atteinte pendant 20 minutes/heure.
  - Recommander de voir le médecin dans les 48 heures si progression ou pas de diminution de la réaction malgré l'utilisation régulière du Bénédryl, car possibilité de surinfection bactérienne.
  - Recommander l'application d'un produit anti moustique et le port de vêtements protecteurs appropriés aux activités.
- Dans les cas de réaction allergique, aviser de consulter le médecin dans un délai  $\geq$  24 à 48 heures, ou aviser le médecin traitant du client hébergé.

Adopté par le CMDP du Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Batiscan

En vigueur le : \_\_\_\_\_

Dates de révision : \_\_\_\_\_